

GREATER BOSTON GASTROENTEROLOGY

George Dickstein, MD

Steven N. Fine, MD

Mark A. Painter, MD

Greta Taitelbaum, MD CM FRCP(C) FACG

Jaime A. Oviedo, M.D.

475 Franklin Street, Suite 110 Framingham, MA 01702 508-620-9200

PREPARACIÓN PARA **ERCP** –

(**E**ndoscopic **R**etrograde **C**holangi**P**ancreatography)

Usted tiene una cita para hacer una ERCP el día _____ a las _____

Por favor de reportarse a las _____ para registraci3n.

MetroWest Medical Center

67 Union Street
3rd floor / Outpt Reg
Natick, MA 01760

MetroWest Medical Center

115 Lincoln Street
1st floor / Outpt Reg
Framingham, MA 01702

Boston Endoscopy Center

175 Worcester Street
Wellesley Hills, MA 02481

1. Ud. Necesita tener un miembro de la familia o amigo para conducirlo a su casa despu3s del ex3men por causa de medicamentos que se le han dado durante el ex3men.
2. Ud. necesita tener el resto del d3a libre, no puede trabajar, conducir, o hacer cualquier cosa esa noche. Necesita descansar por causa de los medicamentos que ud. recibió durante el ex3men.
3. Por favor traiga el d3a del ex3men una lista de todos los medicamentos que ud. toma normalmente
4. Cuando se le fijó la fecha de la cita el seguro que nosotros tenemos es el siguiente:

Si su seguro cambia, por favor de llamar el número 508-620-9200 por lo menos 14 días antes de su ex3men. Ud. va a tener que pagar el ex3men si no tenemos la informaci3n correcta de su seguro.

Por favor siga todas las instrucciones completamente. Si ud. tiene cualquier pregunta sobre esta preparaci3n, por favor llámenos.

1. Si ud. sabe que tiene un problema con el coraz3n o una v3lvula para el coraz3n, por favor díganos, porque antibioticos ser3n necesarios para evitar una infecci3n.
2. Por favor, díganos si ud. toma Coumadin o Warfarin. Deber3 para de tomar esos remedios 5 d3as antes del ex3men
3. Por favor, díganos si ud. toma insulina. Va a tener que cambiar su dosis para la preparaci3n y para el ex3men. Si ud. toma remedios para la diabetes, tome media dosis de lo que toma normalmente el d3a del ex3men.
4. Este ex3men muchas veces se hace con rayos-x... Si ud. sabe que est3 embarazada o ud. piensa que puede estar encinta, por favor díganos antes del ex3men.
5. No tomar aspirina, comprimidos con aspirina, Ecotrin, Bufferin, Anacin, Advil, Aleve, Nuprin, Motrin, Ibuprofen, o medicamentos contra inflamaci3n o Plavic por 7 d3as antes del ex3men. Si tiene alg3n problema con esto, por favor discutirlo con su doctor. Puede tomar Tylenol o acetaminophen cuando quiera antes y despu3s del ex3men. No tomar suplementos de hierro por 7 d3as antes del ex3men.
6. Ud. Necesita tener un miembro de la familia o amigo para conducirlo a su casa despu3s del ex3men por causa de medicamentos que se le han dado durante el ex3men. El ERCP **no se podr3 llevar a cabo** si ud. no tiene una persona que lo acompañe cuando ud. sale del hospital.
7. Si su ex3men es **antes del medio d3a**, no debe tomar nada por la boca despu3s de la media noche, excepto sus medicamentos diarios con un poco de agua. Si su cita es **despu3s del medio d3a**, puede tomar l3quidos claros hasta 4 horas antes de su ex3men.

Lo siguiente es una lista de l3quidos considerados claros:

Caldo de pollo, gingerale, sprite, 7-up, jugo de manz3na, jugo de uva blanca, agua, chupete helados, gelatina (menos de color rojo o morado, no puede tomar con fruta o crema) caf3 o t3 (puede tomar con az3car, pero no leche o crema)